Journée des droits des femmes

Margaret Heafield Hamilton, née le 17 août 1936,
est une informaticienne et ingénieure système.
Elle était directrice du département software engineering
qui conçut le système embarqué du programme spatial Apollo

https://www.youtube.com/watch?v=4sKY6_nBLG0

Journée des droits des femmes

Comment communiquer en écrivant
des textes lisibles et inclusifs
en n'invisibilisant pas les femmes
et les personnes non-binaires...

Plan du cours de méthodes numériques

Comment résoudre
numériquement un
problème aux
valeurs initiales ?

Comment interpoler
une fonction ?

Comment dériver
numériquement
une fonction ?

Comment approximer
une fonction ?

Comment résoudre
numériquement un
problème aux
conditions frontières ?

Comment intégrer
numériquement
une fonction ?

Et les équations
non linéaires ?

*Comment résoudre numériquement
une équation différentielle ordinaire ?*

Et les méthodes itératives ?

*Comment résoudre numériquement
une équation aux dérivées partielles ?*

Comment résoudre
numériquement une
équation aux dérivées
partielles ?

Une surface à intégrer....

Comment l'intégrer sur un ordinateur ?

Intégration numérique

Quadrature :

On estime l'intégrale définie I en effectuant une **somme pondérée** des valeurs $u(X_j)$

$$I = \int_a^b u(x) dx$$

Abscisses d'intégration
calculées a priori

$$I \approx I^h = \sum_{i=0}^m w_i u(X_i)$$

$$E^h = I - I^h$$

Poids calculés a priori

Prise de mesures...

$$U_0 = 2$$

Si $X_0 = a$ et $X_n = b$, méthode fermée
Sinon, méthode ouverte

Standardisons !

$$I^h = \sum_{i \in [-1, 1]} w_i f(x_i)$$

Aussi :-)

$$\begin{aligned}
 x(\xi) &= a \underbrace{\phi_{-1}(\xi)}_{\frac{(1-\xi)}{2}} + b \underbrace{\phi_1(\xi)}_{\frac{(1+\xi)}{2}} \\
 &= a \frac{(1-\xi)}{2} + b \frac{(1+\xi)}{2} \\
 &= \frac{(b-a)}{2} \xi + \frac{(a+b)}{2}
 \end{aligned}$$

$$x(\xi) = \left(\frac{a+b}{2}\right) + \xi \left(\frac{b-a}{2}\right)$$

$$\int_a^b v(x) dx = \int_{-1}^1 v(\xi) \underbrace{\frac{dx}{d\xi}}_{\text{JACOBIEN } \frac{(b-a)}{2}} d\xi$$

Simplifions, standardisons,

...

$$x(\xi) = \frac{(b-a)}{2} \xi + \frac{(b+a)}{2}$$

$$I = \int_a^b u(x) dx = \int_{-1}^1 u(x(\xi)) \frac{dx}{d\xi} d\xi = \underbrace{\int_{-1}^1 u(x(\xi)) d\xi}_{\approx \sum_{i=0}^m w_i u(x(\Xi_i))} \frac{(b-a)}{2}$$

Méthodes d'intégration

Méthodes à pas égaux :
Règles de Newton-Cotes

Méthodes à pas inégaux :
Règles de Gauss-Legendre

Méthodes récursives :
Extrapolation de Richardson
Méthodes de Romberg

Méthodes adaptatives :
ou les méthodes numériques
intelligentes...

Avec l'interpolation polynomiale, tout est facile...

$$\begin{aligned}
 I &\approx \overbrace{\int_{-1}^1 u^h(x) dx}^{I^h} \\
 &\downarrow \\
 &\approx \int_{-1}^1 \sum_{i=0}^m u(X_i) \phi_i(x) dx \\
 &\downarrow \\
 &\approx \sum_{i=0}^m u(X_i) \underbrace{\int_{-1}^1 \phi_i(x) dx}_{w_i}
 \end{aligned}$$

$\int_{-1}^1 u(x) dx \approx U_{-1} + U_1$	(méthode des trapèzes) $d = 1$
$\int_{-1}^1 u(x) dx \approx \frac{1}{3} U_{-1} + \frac{4}{3} U_0 + \frac{1}{3} U_1$	(méthode de Simpson) $d = 3$
$\int_{-1}^1 u(x) dx \approx \frac{1}{4} U_{-1} + \frac{3}{4} U_{-1/3} + \frac{3}{4} U_{1/3} + \frac{1}{4} U_1$	(méthode de Simpson $\frac{3}{8}$) $d = 3$
$\int_{-1}^1 u(x) dx \approx \frac{7}{45} U_{-1} + \frac{32}{45} U_{-1/2} + \frac{12}{45} U_0 + \frac{32}{45} U_{1/2} + \frac{7}{45} U_1$	(méthode de Boole) $d = 5$

Quelques pages du grimoire de Gargamel

Sur l'intervalle standard...

SIMPSON

$$I^h = U_{-1} \int_{-1}^1 \frac{(x-1)x}{2} + U_0 \int_{-1}^1 \frac{(x-1)(x+1)}{-1} + U_1 \int_{-1}^1 \frac{(x+1)x}{2}$$

$$\int_{-1}^1 \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} = \left[\frac{x^3}{6} - \dots \right]_{-1}^1$$

$\frac{1}{3}$

$$\int_{-1}^1 \frac{x^2}{-1} + \frac{-1}{-1} = \left[-\frac{x^3}{3} + x \right]_{-1}^1$$

$$= -\frac{2}{3} + 2 = -\frac{2+6}{3} = \frac{4}{3}$$

$$I^h = U_{-1} + \frac{4U_0}{3} + U_1$$

SANITY CHECK

Comment
obtenir les
formules
magiques ?

$$\int_{-1}^1 u(x) dx \approx \int_{-1}^1 \overbrace{u^h(x)}^{I^h} dx$$

$$\approx \sum_{i=0}^2 u(X_i) \underbrace{\int_{-1}^1 \phi_i(x) dx}_{w_i}$$

En fixant $X_0 = -1$, $X_1 = 0$ et $X_2 = 1$

$$\approx U(-1) \underbrace{\int_{-1}^1 \frac{(x-1)x}{2} dx}_{w_0}$$

$$+ U(0) \underbrace{\int_{-1}^1 \frac{(x-1)(x+1)}{-1} dx}_{w_1}$$

$$+ U(1) \underbrace{\int_{-1}^1 \frac{(x+1)x}{2} dx}_{w_2}$$

Calcul des poids

$$w_0 = \int_{-1}^1 \frac{(x-1)x}{2} dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{4} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3}$$

$$w_1 = \int_{-1}^1 1 - x^2 dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$w_2 = \int_{-1}^1 \frac{(x+1)x}{2} dx = \left[\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{4} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3}$$

Avec une interpolation de degré 2,
on intègre exactement un
polynôme de degré 3....

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \sum_{i=0}^{2n+1} a_i x^i dx &= \int_{-1}^1 \sum_{j=0}^n a_{2j} x^{2j} dx + \underbrace{\int_{-1}^1 \sum_{j=0}^n a_{2j+1} x^{2j+1} dx}_{=0} \\ &= \int_{-1}^1 \sum_{i=0}^{2n} a_i x^i dx\end{aligned}$$

Une formule symétrique
développée pour un degré n **pair** a
un degré de précision $n+1$

*L'intervalle d'intégration **ne doit pas** être symétrique !*

Le changement de variable ne change en rien la précision de la méthode.

Introduisons le symbole h

Trapèzes $h = (b-a)$

Simpson $h = (b-a)/2$

Boole $h = (b-a)/4$

$$\int_{-h/2}^{h/2} u(x) dx \approx \frac{h}{2} (U_{-h/2} + U_{h/2})$$

(méthode des trapèzes) $d = 1$

$$\int_{-h}^h u(x) dx \approx \frac{h}{3} (U_{-h} + 4 U_0 + U_h)$$

(méthode de Simpson) $d = 3$

$$\int_{-2h}^{2h} u(x) dx \approx \frac{2h}{45} (7 U_{-2h} + 32 U_{-h} + 12 U_0 + 32 U_h + 7 U_{2h})$$

(méthode de Boole) $d = 5$

Méthodes composites

RECTANGULES
 $d=1$

TRAPEZES
 $d=1$

SIMPSON
 $d=3$

BOOLE
 $d=5$

Méthode composite des trapèzes

$$I = \int_{X_0}^{X_n} u(x) dx$$

$$= \sum_{i=1}^n \int_{X_{i-1}}^{X_i} u(x) dx$$

En utilisant la règle des trapèzes (2.7) pour chaque sous-intervalle

$$I^h = \sum_{i=1}^n \frac{h}{2} (U_{i-1} + U_i)$$

$$= \frac{h}{2} (U_0 + 2U_1 + 2U_2 + \dots + 2U_{n-1} + U_n)$$

Il s'agit d'une interpolation linéaire par morceaux !

Méthode composite de Simpson

Il s'agit d'une interpolation quadratique par morceaux !

$$I = \int_{X_0}^{X_{2n}} u(x) dx$$

$$= \sum_{i=1}^n \int_{X_{2i-2}}^{X_{2i}} u(x) dx$$

En utilisant la règle de Simpson (2.4)
pour chaque sous-intervalle

$$I^h = \sum_{i=1}^n \frac{h}{3} (U_{2i-2} + 4 U_{2i-1} + U_{2i})$$

$$= \frac{h}{3} (U_0 + 4U_1 + 2U_2 + 4U_3 + 2U_4 + \dots + 4U_{2n-1} + U_{2n})$$

n intervalles juxtaposés de longueur 2h
2n+1 abscisses d'intégration

Comment estimer l'erreur d'intégration ?

**Erreur de l'interpolation
polynomiale $e^h(x)$**

**Erreur de l'intégration
numérique $E^h(x)$**

Simpson intègre parfaitement un polynôme de degré 3...

Erreur d'interpolation

$$e^h(x) = \frac{u^{(4)}(\xi)}{4!} (x-h)x(x+h)(x-\alpha)$$

où ξ est un point particulier de l'intervalle $[-h, h]$.

Erreur d'intégration pour Simpson !

$$e^h(x) = \frac{u^{(4)}(\xi)}{4!} (x-h)x(x+h)(x-\alpha)$$

où ξ est un point particulier de l'intervalle $[-h, h]$.

$h \rightarrow 0$
ERREUR ASYMPTOTIQUE

$$E_z^h \approx \sum_{i=1}^n \int_{-h}^h \frac{u'''(\xi_i)}{4!} (x-h)x(x+h)(x-\alpha) dx$$

$\xi_i(x)$
SIMPLIFICATIONS
 $\xi_i(x) \approx \xi_i$

$$\approx \frac{n C_4}{24} \left| \int_{-h}^h \underbrace{(x-h)(x+h)}_{x^2 - h^2} x^2 dx - \alpha \int_{-h}^h \underbrace{(x-h)(x+h)}_{x^2 - h^2} x dx \right|$$

$$= \left[\frac{x^5}{5} - \frac{h^2 x^3}{3} \right]_{-h}^h$$

$$= h^5 \left[\frac{2}{5} - \frac{2}{3} \right] = h^5 \left[\frac{6-10}{15} \right] = -\frac{4}{15} h^5$$

$$\approx \frac{n C_4}{90} h^5$$

Ordre de précision

$$E^h \leq \underbrace{n}_{m(h)} \underbrace{\frac{C_4}{90}}_{O(h^5)} h^5$$

~~NEIN!~~

$$2nh = (b-a)$$

$$n = \frac{(b-a)}{2h}$$

$$E^h \leq \underbrace{\frac{(b-a)}{180}}_{O(h^4)} C_4 h^4$$

ORDRE DE PRÉCISION = 4
 SIMPSON

DEGRÉ DE PRÉCISION
 3

$$4 = 3 + 1$$

Degré de précision

Ordre de précision de Simpson

$$E^h = \sum_{i=1}^n \int_{-h}^h \frac{u^{(4)}(\xi_i)}{4!} (x-h)x(x+h)(x-\alpha) dx$$

En définissant $C_4 = \max_i |u^{(4)}(\xi_i)|$

$$|E^h| \leq n \frac{C_4}{4!} \left| \int_{-h}^h (x-h)x(x+h)(x-\alpha) dx \right|$$
$$\leq n \frac{C_4}{4!} \left| \int_{-h}^h x^2(x-h)(x+h) dx - \alpha \underbrace{\int_{-h}^h (x-h)x(x+h) dx}_{=0} \right|$$
$$\leq n \frac{C_4}{4!} \left| \left[\frac{x^5}{5} - \frac{h^2 x^3}{3} \right]_{-h}^h \right|$$
$$\leq n \frac{C_4}{90} h^5$$

$O(h^5)$,
Monsieur ?

Nenni, nein, neen : $O(h^4)$ only !

$$\leq n \frac{C_4}{90} h^5$$

Car $2nh = (b - a)$ pour une méthode composite de Simpson

$$\leq (b - a) \frac{C_4}{180} h^4$$

***n et h sont deux paramètres liés entre eux !
En d'autres mots, n n'est pas une constante, mais
une fonction de h !***

$$n(h) = (b-a)/2h$$

$$|E^h| \leq \frac{C_4(b-a)}{180} h^4$$

Degré de précision = 3

Ordre de précision = 4

Combien de sous-intervalles pour obtenir une précision donnée ?

$\int_{-h/2}^{h/2} u(x) dx = \frac{h}{2} (U_{-h/2} + U_{h/2}) - \frac{h^3}{12} u^{(2)}(\xi)$ $ E^h \leq \frac{C_2(b-a)}{12} h^2 \quad (\text{méthode des trapèzes}) \quad \mathcal{O}(h^2)$	$\frac{C_2}{12} n \frac{(b-a)^3}{n^3} \leq \epsilon$
$\int_{-h}^h u(x) dx = \frac{h}{3} (U_{-h} + 4U_0 + U_h) - \frac{h^5}{90} u^{(4)}(\xi)$ $ E^h \leq \frac{C_4(b-a)}{180} h^4 \quad (\text{méthode de Simpson}) \quad \mathcal{O}(h^4)$	$\sqrt{\frac{C_2(b-a)^3}{12\epsilon}} \leq n$
$\int_{-2h}^{2h} u(x) dx = \frac{2h}{45} (7U_{-2h} + 32U_{-h} + 12U_0 + 32U_h + 7U_{2h}) - \frac{8h^7}{945} u^{(6)}(\xi)$ $ E^h \leq \frac{2C_6(b-a)}{945} h^6 \quad (\text{méthode de Boole}) \quad \mathcal{O}(h^6)$	

Méthodes d'intégration

Méthodes à pas égaux :
Règles de Newton-Cotes

Méthodes à pas inégaux :
Règles de Gauss-Legendre

Méthodes récursives :
Extrapolation de Richardson
Méthodes de Romberg

Méthodes adaptatives :
ou les méthodes numériques
intelligentes...

Gauss-Legendre

$n+1$ POINTS

IL DEVRAIT ETRE POSSIBLE
D'INTEGRER PARFAITEMENT
UN POLYNOME DE DEGRE
 $2n+1$

$$p(x) = \sum_{i=0}^{2n+1} a_i x^i$$

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \sum_{k=0}^n w_k p(X_k)$$

$$\sum_{i=0}^{2n+1} a_i \int_{-1}^1 x^i dx = \sum_{k=0}^n w_k \sum_{i=0}^{2n+1} a_i X_k^i$$

$$\sum_{j=0}^n a_{2j} \int_{-1}^1 x^{2j} dx + \sum_{j=0}^n a_{2j+1} \int_{-1}^1 x^{2j+1} dx = 0$$

$$\sum_{j=0}^n a_{2j} X_k^{2j} + \sum_{j=0}^n a_{2j+1} X_k^{2j+1}$$

CAS PARTICULIER

$n=1$

$$\begin{cases} X_0^3 w_0 + X_1^3 w_1 = 0 & \checkmark \\ X_0^2 w_0 + X_1^2 w_1 = \frac{2}{3} & \checkmark \\ X_0 w_0 + X_1 w_1 = 0 & \checkmark \\ w_0 + w_1 = 2 & \checkmark \end{cases}$$

$$2X_0^2 = \frac{2}{3} \implies X_0 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$w_1 = w_0 = 1$$

$$X_0 = -X_1$$

$$\frac{2}{2j+1} = \sum_{k=0}^n w_k X_k^{2j}$$

$$0 = \sum_{k=0}^n w_k X_k^{2j+1}$$

$j = 0 \dots n$

LES EQUATIONS
A RESOUDRE !

Méthodes à pas inégaux :

Gauss-Legendre

Simpson sur un intervalle
Degré de précision = 3
Nombre de points = 3

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \sum_{k=0}^n w_k p(X_k),$$

Choisir des abscisses équidistantes n'est pas le meilleur choix !

↓ En développant le polynôme,

$$\sum_{i=0}^{2n+1} \int_{-1}^1 a_i x^i dx = \sum_{k=0}^n w_k \sum_{i=0}^{2n+1} a_i X_k^i$$

Gauss-Legendre sur un intervalle
Degré de précision = 2n+1
Nombre de points = n+1

↓ En séparant les termes pairs et impairs,

$$\sum_{j=0}^n \int_{-1}^1 a_{2j} x^{2j} dx + \sum_{j=0}^n \int_{-1}^1 a_{2j+1} x^{2j+1} dx = \sum_{k=0}^n w_k \sum_{j=0}^n a_{2j} X_k^{2j} + \sum_{k=0}^n w_k \sum_{j=0}^n a_{2j+1} X_k^{2j+1}$$

↓ En effectuant les intégrales,

$$\sum_{j=0}^n \frac{2}{(2j+1)} a_{2j} + 0 = \sum_{k=0}^n w_k \sum_{j=0}^n a_{2j} X_k^{2j} + \sum_{k=0}^n w_k \sum_{j=0}^n a_{2j+1} X_k^{2j+1}$$

Calcul des abscisses de Gauss-Legendre

$$\begin{aligned} (X_0^3 w_0 + X_1^3 w_1) &= 0, \\ (X_0^2 w_0 + X_1^2 w_1) &= 2/3, \\ (X_0 w_0 + X_1 w_1) &= 0, \\ (w_0 + w_1) &= 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_0 &= w_1 = 1, \\ -X_0 &= X_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$n + 1$	$X_k, -X_{n-k}$	w_k, w_{n-k}
1	0.0000000000000000	2.0000000000000000
2	0.577350269189626	1.0000000000000000
3	0.774596669241483 0.0000000000000000	0.5555555555555556 0.8888888888888889
4	0.861136311594053 0.339981043584856	0.347854845137454 0.652145154862546
5	0.906179845938664 0.538469310105683 0.0000000000000000	0.236926885056189 0.478628670499366 0.5688888888888889
6	0.932469514203152 0.661209386466265 0.238619186083197	0.171324492379170 0.360761573048139 0.467913934572691

La manière la plus efficace et la plus précise d'intégrer sur un intervalle donné (et borné!) un polynôme de degré $2n+1$ dont on connaît les coefficients est d'utiliser une règle de Gauss-Legendre avec $n+1$ points.

Vrai ou Faux ?

$n + 1$	$X_k, -X_{n-k}$	w_k, w_{n-k}
1	0.0000000000000000	2.0000000000000000
2	0.577350269189626	1.0000000000000000
3	0.774596669241483 0.0000000000000000	0.5555555555555556 0.8888888888888889
4	0.861136311594053 0.339981043584856	0.347854845137454 0.652145154862546
5	0.906179845938664 0.538469310105683 0.0000000000000000	0.236926885056189 0.478628670499366 0.5688888888888889
6	0.932469514203152 0.661209386466265 0.238619186083197	0.171324492379170 0.360761573048139 0.467913934572691

Evaluation S7 : vrai ou faux...

Un petit exemple en 2D...

Quelle est la valeur de l'intégrale double

$$I = \int_D x \, dx \, dy$$

où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tels que } x^2 + y^2 \leq 1 \text{ et } x \geq 0\}$?

D'abord les x, puis les y...

$$I = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} x \, dx \, dy$$

$\underbrace{\int_0^{\sqrt{1-y^2}} x \, dx}_{\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{\sqrt{1-y^2}}}$

$$\int_{-1}^1 \frac{1-y^2}{2} \, dy = \left[\frac{y}{2} - \frac{y^3}{6} \right]_{-1}^1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$I_h = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{2}{3}$$

D'abord les y, puis les x...

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \, dx \\ &= \int_0^1 \underbrace{-2x\sqrt{1-x^2}}_{\left[(1-x^2)^{3/2} \frac{2}{3} \right]_0^1} dx = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$I^h = 0,69 \approx \frac{2}{3}$$

D'abord les x puis les y ...

$$I = \int_{-1}^1 \left(\int_0^{\sqrt{1-y^2}} x \, dx \right) dy$$

En intégrant le long de x pour chaque y

$$= \int_{-1}^1 \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=0}^{x=\sqrt{1-y^2}} dy$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{1-y^2}{2} dy$$

En intégrant le long de y

$$= \left[\frac{y}{2} - \frac{y^3}{6} \right]_{y=-1}^{y=1} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

...et numériquement ?

$$I = \boxed{\begin{array}{l} \text{Surface du triangle en} \\ y = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{l} \text{Surface du triangle en} \\ y = +\frac{\sqrt{3}}{3} \end{array}}$$
$$= 2 \left(\frac{1}{2} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right) = \frac{2}{3}$$

D'abord les y , puis les x ...

$$I = \int_0^1 x \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \right) dx$$

En intégrant le long de y pour chaque x

$$= \int_0^1 x \left[y \right]_{y=-\sqrt{1-x^2}}^{y=\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= \int_0^1 2x \sqrt{1-x^2} dx$$

En intégrant le long de x

$$= \left[\frac{-2}{3} (1-x^2)^{3/2} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{2}{3}$$

...et numériquement ?

$$I = \frac{1}{2} \left(\begin{array}{c} \text{Surface du rectangle en} \\ x = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Surface du rectangle en} \\ x = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} \end{array} \right)$$
$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} \right) \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} \right)^2} + \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} \right) \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} \right)^2} = 0.6914 \simeq \frac{2}{3}$$

Intégration sur un triangle : Règle de Hammer à 3 points

$$\underbrace{\int_{\mathcal{T}} f(x, y) \, dx \, dy}_I \approx \underbrace{\sum_{k=1}^3 w_k f(X_k, Y_k)}_{I^h}$$

	X_k	Y_k	w_k
1	0.5	0.0	1/6
2	0.5	0.5	1/6
3	0.0	0.5	1/6

Démontrer que la formule de Hammer à trois points permet d'intégrer exactement n'importe quel polynôme à deux variables de degré deux : $a + bx + cy + dx^2 + ey^2 + fxy$

Question

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{a}{2} + b \int_0^1 x \int_0^{1-x} dy \, dx + c \int_0^1 y \int_0^{1-y} dx \, dy \\
 &\quad + d \int_0^1 x^2 \int_0^{1-x} dy \, dx + e \int_0^1 y^2 \int_0^{1-y} dx \, dy + f \int_0^1 x \int_0^{1-x} y \, dy \, dx \\
 &= \frac{a}{2} + b \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 + c \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^1 \\
 &\quad + d \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 + e \left[\frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^1 + f \left[\frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{8} \right]_0^1 \\
 &= \frac{a}{2} + \frac{b}{6} + \frac{c}{6} + \frac{d}{12} + \frac{e}{12} + \frac{f}{24} \\
 &= I^h
 \end{aligned}$$

Degré de
précision

Et un autre triangle ?

$$\begin{aligned}x' &= 10x \\ y' &= 15 - 15y\end{aligned}$$

Un petit mot
sur le
devoir...

Obtenir le
champs
magnétique...

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} \left[3(\boldsymbol{\mu} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \boldsymbol{\mu} \right]$$

Déplaçons le petit aimant...

... et calculons le flux !

$$\phi(t) = \int_{\Omega_b} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}_z \, d\mathbf{x} = \int_{\Omega_b} B_z(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \sum_{i=0}^n \int_{\Omega_i} B_z(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

En utilisant une méthode de Hammer avec un point :-)

$$\approx \sum_{i=0}^n B_z(\mathbf{X}_i) \Delta_i$$

Et prédire
la tension induite
dans la bobine...

$$V_L = -N \frac{d\phi}{dt}(t)$$