



Mais,
plus pour des
équations
d'advection diffusion !



Un petit préliminaire !

Y a un questionnaire QOPA qui devrait être accessible ?



Chères étudiantes et chers étudiants,
Vous voilà à l'issue de votre programme de bachelier ingénieur,

C'est pourquoi lors du cours d'éléments finis (LEPL1110) le 10 mai à 10h45, nous vous demandons de prendre un peu de temps pour répondre à un petit questionnaire.

Oui : je sais : vous êtes super occupés !

Oui : je sais : vous n'aimez pas les questionnaires !

Oui : je sais : à quoi cela sert-il de répondre car de toute façon, on ne tiendra pas compte de votre avis !
Mais, justement, on a BESOIN de votre avis : car si nous enseignons, c'est pour VOUS !

Ce questionnaire est évidemment anonyme.

Il vise à recueillir vos avis (positifs et négatifs) sur le programme de bachelier dans son ensemble, de la BAC1 à la BAC3.

L'objectif, vous vous en doutez, est d'améliorer et optimiser le programme pour les générations futures d'étudiants.

Nous comptons donc sur l'avis de toutes et tous !

Ce 10 mai, vous recevrez un lien personnel de la part d'une entité externe à l'EPL qui gèrera les données de manière confidentielle (QOPA).

Vous pourrez compléter ce questionnaire, au cours, à l'aide de votre ordi ou smartphone.

Pour vous récompenser de votre effort, 15 étudiants ayant répondu au questionnaire seront sélectionnés au hasard par l'entité externe.

Oui : personne ne saura si vous avez répondu, si vous avez gagné une place de cinéma : on ne rigole pas avec l'anonymat ici :-)


Un tout grand merci d'avance pour votre coopération !

Delphine Ducarme (conseillère pédagogique)

Vincent Legat (responsable de la commission BacTroncCommun : BTC1)

NOTE :-)
IL N'Y AURA
PAS DE COURS
EN S-13
LE VENDREDI
17/5 !

Advection pure




Trouver $u(\mathbf{x})$ tel que

$$\boldsymbol{\beta} \cdot \nabla u = f, \quad \forall x \in \Omega,$$

$$u = 0, \quad \forall x \in \Gamma_-$$

$$\frac{d\mathbf{x}}{ds}(s) = \boldsymbol{\beta}(\mathbf{x}, s)$$



Trouver $u(\mathbf{x}) \in \mathcal{U}_s$ tel que

$$\boldsymbol{\beta} \cdot \nabla u - \nabla \cdot (\epsilon \nabla u) = f, \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega,$$

$$\mathbf{n} \cdot (\epsilon \nabla u) = g, \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_N,$$

$$u = t, \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_D,$$

$$\frac{d\mathbf{x}}{ds}(s) = \boldsymbol{\beta}(\mathbf{x}, s)$$


Advection-diffusion

EQUATION D'ADVECTION - DIFFUSION

$$\beta \frac{du}{dx} - \epsilon \frac{d^2u}{dx^2} = 0$$

$$u(0) = u_0$$

$$u(L) = u_L$$



$$\beta = 0 \quad \frac{d^2u}{dx^2} = 0$$




$$\epsilon = 0 \quad \beta \frac{du}{dx} = 0$$




$$P_e = \frac{\beta L}{\epsilon}$$

$$\frac{u - u_0}{u_L - u_0} = \frac{\exp\left(\frac{\beta x}{\epsilon}\right) - 1}{\exp\left(\frac{\beta L}{\epsilon}\right) - 1}$$


$P_e \times /L$
 P_e




epsilon = 0.01;
beta = 0.0;



epsilon = 0.01;
beta = 0.2;



epsilon = 0.01;
beta = 1.0;



Trouver $u(\mathbf{x}) \in \mathcal{U}_s$ tel que

$$\beta \cdot \nabla u - \nabla \cdot (\epsilon \nabla u) = f, \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega,$$

$$\mathbf{n} \cdot (\epsilon \nabla u) = g, \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_N,$$

$$u = t, \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_D,$$

Advection-diffusion

Equation de transport !
 Advection pure !

$$\frac{dv}{dx} = f$$

$$v(0) = U_0$$

$$v(x) \approx v^h(x) = \sum U_i \tau_i(x)$$



GALERKIN

? U_i quel que

$$\langle \tau_i, r^h \rangle = 0$$

B_i

$$\sum_j \underbrace{\langle \tau_i, \tau_j \rangle}_{A_{ij}} U_j = \langle \tau_i, f \rangle$$

$$\underbrace{\frac{dv^h}{dx}}_{r^h} - f \approx 0$$

Appliquons la méthode de Galerkin
à notre problème de transport

Bubnov-Galerkin !

Ce n'est plus un problème de minimisation

$$u \approx u^h = \sum U_i \tau_i$$

$$\langle r^h, \hat{\tau}_i \rangle = 0 \quad \forall i$$

$$\hat{\tau}_i = \tau_i$$

Petrov-Galerkin !

C'est plus le même problème !

$$\frac{dv}{dx} = f$$

$$v(0) = 0$$

$$\langle \tau^h, \hat{\tau}_i \rangle = 0 \quad \forall i$$

$$\langle \underbrace{\left(\frac{d u^h}{dx} - f \right)}_{\sum U_j \tau_{j,x}} \tau_{i,x} \rangle = 0$$

$$\hat{\tau}_i = \tau_{i,x}$$

$$\sum U_j \underbrace{\langle \tau_{i,x}, \tau_{j,x} \rangle}_{A_{ij}} = \underbrace{\langle f, \tau_{i,x} \rangle}_{-\langle f, \tau_i \rangle} + \cancel{\langle \dots \rangle}$$

MATRICE
DEFINIE
POSITIVE

$$\frac{d^2 v}{dx^2} = \frac{df}{dx}$$

$$v(0) = 0$$


$$v'(L) = 0$$



EQUATION DE TRANSPORT

$$\frac{du}{dx} = f$$

$$u(0) = u_0$$

$$u \approx u_h = \sum_i U_i \tau_i(x)$$


GALERKIN

? U_i TELS QUE

$$\langle \tau_i, \Gamma_h \rangle = 0$$

$$\sum_j \underbrace{\langle \tau_i, \tau_j, x \rangle}_{A_{ij}} U_j = \underbrace{\langle \tau_i, f \rangle}_{B_i}$$

≠ MATRICE DEFINIE POSITIVE !

$$\frac{du}{dx} = f$$

GALERKIN


$$\sum_j A_{ij} U_j = B_i$$

BUBNOV - GALERKIN

DIFFERENCES FINIES CENTREES

$$U_{j+1} - U_{j-1} = B_j \cdot 2\Delta x$$

TERRA INCOGNITA ?



PROBLEME DE MINIMISATION


$$f(x) = \sin(x)$$

$$f(x) = \uparrow$$

OK

Bout

Bout



PETROV-GALERKIN

? U_j TELS QUE

$$\langle \tau_{j,x} | r^h \rangle = 0$$

0 → INTEGRATION LE LONG DES CARACTERISTIQUES

DIFFERENCES FINIES AMONT

$$U_{j+1} - U_j = B_j \Delta x$$

$$\sum_j \underbrace{\langle \tau_{i,x} | \tau_{j,x} \rangle}_{A_{ij}} U_j = \underbrace{\langle \tau_{i,x} | f \rangle}_{B_i}$$

MATRICE DEFINIE POSITIVE

1 CONDITION AUX LIMTES !

$\frac{du}{dx} = f$

A ÉTÉ REMPLACÉ PAR $\frac{d^2 u}{dx^2} = \frac{df}{dx}$




2 CONDITIONS AUX LIMTES !

HIC

En bref :-)

$$\frac{du}{dx} = f,$$

$$u(0) = 0,$$

<p>Galerkin $w_i = \tau_i$</p> 	<p><i>Différences finies centrées</i></p> <p>Simple et donc tentant... Oscillations numériques si f n'est pas lisse !</p> $\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} = \frac{F_{i+1} + 4F_i + F_{i-1}}{6},$
<p>Petrov-Galerkin $w_i = \tau_{i,x}$</p> 	<p><i>Différences finies centrées d'ordre deux</i></p> <p>Mathématiquement, tentant Condition frontière parasite !</p> $\frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} = \frac{F_{i+1} - F_{i-1}}{2h},$
<p>Petrov-Galerkin $w_i = \tau_{i-1}^{cst}$</p> 	<p><i>Différences finies amont</i></p> <p>Quasiment optimal... Correspond à une intégration le long de la caractéristique, Pas d'oscillation numérique</p> $\frac{U_i - U_{i-1}}{h} = \frac{F_{i+1} + F_{i-1}}{2},$

Petrov-Galerkin !

Comment sélectionner
le paramètre magique ?

$$u_x - \varepsilon u_{,xx} - f = 0$$

$\tau_{i,x}$ τ_i

$$\langle \overbrace{(\tau_i + \zeta \tau_{i,x})}^{\hat{\tau}_i} (u_x^h - \varepsilon u_{,xx}^h - f) \rangle = 0$$

$\sqrt{\zeta}$

$$\sum u_j \left[\begin{array}{l} \zeta \langle \tau_{i,x} \tau_{j,x} \rangle - \varepsilon \zeta \langle \tau_{i,x} \tau_{j,xx} \rangle \\ + \varepsilon \langle \tau_{i,x} \tau_{j,x} \rangle + \varepsilon \langle \tau_i \tau_{j,x} \rangle \end{array} \right] = \dots$$

$-\varepsilon \langle \tau_i \tau_{j,xx} \rangle + \ll \gg$



$\zeta \nearrow$ 😊 AUGMENTE !
 MAIS
 ☹️ AUGMENTE AUSSI !
 SAUF si $\tau_{i,xx} = 0$!

PETROV-GALERKIN

$$\langle (\tau_c + \zeta \tau_{i,x}) (\underbrace{u_{,x}^h - \epsilon u_{,xx}^h - f}_{\Gamma^h}) \rangle = 0$$

$\hat{\tau}_c$ (under $\tau_c + \zeta \tau_{i,x}$)

How TO SELECT ζ ?

2D

$$\hat{\tau}_c = \tau_c + \zeta \beta \cdot \nabla \tau_c$$

STREAMLINE UPWINDING

$$\sum_j$$

(

$$\zeta \langle \tau_{i,x} \tau_{j,x} \rangle$$

$$+ \epsilon \langle \tau_{i,x} \tau_{j,xx} \rangle$$

)

-


(

$$\epsilon \zeta \langle \tau_{i,x} \tau_{j,xx} \rangle$$

$$+ \langle \tau_c \tau_{j,x} \rangle$$

)

$$) U_j = \dots$$




Différences finies centrées

On résout analytiquement

le problème discret...

$$\beta u_x = \varepsilon u_{xx}$$

$$Pe = \frac{\beta L}{\varepsilon}$$



$$\beta \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} = \varepsilon \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2}$$

$$U_i = A \lambda^i + B$$

$$\cancel{A} \lambda^{i-1} \left[\frac{\beta h}{2\varepsilon} (\lambda^2 - 1) \right] = \cancel{A} \lambda^{i-1} (\lambda^2 - 2\lambda + 1)$$

$$0 = \underbrace{(1 - \zeta)}_a \lambda^2 - 2\lambda + \underbrace{(1 + \zeta)}_c$$

$$\underbrace{\frac{Pe h}{2}}_{\zeta} \quad \text{PECLET DE MAILLE}$$

$$\frac{\beta h}{2\varepsilon} = \frac{Pe h}{2} < 1$$
$$h < \frac{2\varepsilon}{\beta}$$

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{1 - ac}}{a}$$

$$= \frac{1 \pm \sqrt{\cancel{\lambda} - \cancel{\lambda} + (\zeta)^2}}{(1 - \zeta)}$$

$$= \frac{1 + \zeta}{1 - \zeta}$$


... et on déduit le critère de stabilité !

DIFF. CENTRÉES

$$\beta \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} = \varepsilon \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2}$$

$U_0 = u_0$
 $U_N = u_L$

EQUATION AUX RECURRENCES !



$$\cancel{A} r^{i-1} \frac{\beta h}{2\varepsilon} (r^2 - 1) = \cancel{A} r^{i-1} (r^2 - 2r + 1)$$

$$0 = \left(\frac{1 - Pe^h/2}{2} \right) r^2 - r + \left(\frac{1 + Pe^h/2}{2} \right)$$

$$\Delta = \frac{Pe^h}{2}$$

PECLET DE MAILLE

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{1 - (1 + Pe^h/2)(1 - Pe^h/2)}}{(1 - Pe^h/2)}$$

$$r = \frac{1 + Pe^h/2}{1 - Pe^h/2}$$

REJECT $r=1$ OF COURSE !

$$\frac{U_i - v_0}{v_h - v_0} = \frac{\left(\frac{1 + P_e h/2}{1 - P_e h/2} \right)^i - 1}{\left(\frac{1 + P_e h/2}{1 - P_e h/2} \right)^N - 1}$$

$$\approx \exp(P_e h) \quad N$$

$$\approx \exp\left(\frac{\beta h N}{\epsilon}\right)$$

P_e

[SCHAUM p 551]

$$\frac{x}{e^x - 1} \approx 1 - \frac{x}{2}$$

$$\left(1 + \frac{x}{2}\right) = e^x \left(1 - \frac{x}{2}\right)$$



$\frac{P_e h}{2} < 1$

TO AVOID
OSCILLATORY
BEHAVIOUR

Galerkin converge si on raffine le maillage suffisamment !

`epsilon = 0.01;`
`beta = 1.0;`

L'équation d'advection-diffusion est formellement une équation elliptique et donc c'était prévisible par la théorie !



Différences finies décentrées.

On résout analytiquement
le problème discret...

$$\beta \frac{U_i - U_{i-1}}{h} = \varepsilon \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2}$$

$$\cancel{A} \lambda^{i-1} \left[\frac{\beta h}{2\varepsilon} (\lambda^2 - 1) \right] = \cancel{A} \lambda^{i-1} (\lambda^2 - 2\lambda + 1)$$

$$\frac{\beta h}{\varepsilon} (\lambda - 1)$$

$$\hat{\xi} = \frac{\beta h}{2\varepsilon}$$

$$0 = \lambda^2 - 2\lambda(1 + \hat{\xi}) + (1 - 2\hat{\xi})$$

$$\lambda = (1 + \hat{\xi}) \pm \sqrt{(1 + \hat{\xi})^2 - (1 - 2\hat{\xi})}$$

$$\downarrow \\ = (1 + 2\hat{\xi})$$

$$\beta u_x = \left(\varepsilon + \frac{\beta h}{2} \right) u_{,xx}$$

$$\beta \frac{U_i - U_{i-1}}{h} = \varepsilon \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2}$$

$$\beta \left[\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} \right] = \left[\frac{U_{i+1}}{h^2} - \frac{2U_i}{h^2} + \frac{U_{i-1}}{h^2} \right] \left[\frac{\beta h}{2} \right]$$

... et on obtient la diffusion numérique !

UPWIND DIFF.

$$\beta \frac{U_i - U_{i-1}}{h} = \varepsilon \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2}$$

$$U_0 = u_0$$

$$U_N = u_L$$

$\cancel{A} r^{i-1} \underbrace{\frac{\beta h}{\varepsilon}}_{\triangleq Pe^h} (\pi - 1) = \cancel{A} r^{i-1} (\pi^2 - 2\pi + 1)$

$$0 = \frac{\pi^2}{2} - (1 + Pe^h/2)\pi + \frac{(1 + Pe^h)}{2}$$

$$\pi = \frac{(1 + Pe^h/2) \pm \sqrt{(1 + Pe^h/2)^2 - (1 + Pe^h)}}{1}$$

$$= 1 + Pe^h$$

$$\frac{U_i - u_0}{u_L - u_0} = \frac{(1 + Pe^h)^i - 1}{(1 + Pe^h)^N - 1}$$


$(1 + Pe^h) > 0$
 $\forall h$
 NO OSCILLATIONS

BUT...

NUMERICAL DIFFUSION

$$\beta \frac{U_i - U_{i-1}}{h} = \epsilon \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2}$$

$$\beta \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} - \underbrace{\frac{\beta h}{2}}_{\text{NUMERICAL DIFFUSIVITY}} \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2}$$



On fait le meilleur compromis !
On résout analytiquement
le problème discret...

$$\beta(1-\zeta) \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} + \zeta \beta \frac{U_i - U_{i-1}}{h} = \varepsilon \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2}$$

... et on obtient la méthode parfaite !

HYBRID SCHEME

$$(1-\zeta)\beta \frac{U_{i+1}-U_{i-1}}{2h} + \zeta\beta \frac{U_i-U_{i-1}}{2h} = \varepsilon \frac{U_{i+1}-2U_i+U_{i-1}}{h^2}$$

$$0 = \left(1 - \frac{(1-\zeta)P_e h/2}{2}\right) \pi^2 - \left(1 + \zeta P_e h/2\right) \pi + \left(1 + \frac{(1-\zeta)P_e h/2}{2} + \zeta P_e h/2\right)$$

$$\pi = \frac{(1 + \zeta P_e h/2) \pm \sqrt{\begin{matrix} (1 + \zeta P_e h/2)^2 \\ - (1 - (1-\zeta)P_e h/2) \\ (1 + (1-\zeta)P_e h/2) \end{matrix}}}{(1 - (1-\zeta)P_e h/2)}$$

} = $P_e h/2$

$$\pi = \frac{1 + (1 + \zeta) P_e h/2}{1 - (1 - \zeta) P_e h/2}$$

HOW TO
SELECT ζ ?

$$U_i = u(ih)$$

$$\left(\frac{1 + (1 + \zeta) P_e h/2}{1 - (1 - \zeta) P_e h/2} \right)^i = \underbrace{\exp\left(\frac{\beta h}{\varepsilon} i\right)}_{\left(\exp(P_e h)\right)^i}$$

$$\left(1 + P_e h/2\right) - \zeta P_e h/2 = \exp(P_e) \left(\left(1 - P_e h/2\right) + \zeta P_e h/2 \right)$$


$$\begin{aligned}
 \zeta \frac{P_e h}{2} (1 - \exp(-P_e h)) &= \exp(P_e h) \left(1 - \frac{P_e h}{2}\right) - \left(1 + \frac{P_e h}{2}\right) \\
 &\downarrow \\
 \zeta &= \frac{\exp(P_e h) \left(\frac{2}{P_e h} - 1\right) - \left(\frac{2}{P_e h} + 1\right)}{(1 - \exp(-P_e h))} \\
 &\downarrow \\
 &= \underbrace{\frac{-(1 + \exp(P_e h))}{(1 - \exp(P_e h))}}_{\coth(P_e h/2)} - \frac{2}{P_e h}
 \end{aligned}$$


$$\boxed{\zeta = \coth\left(\frac{P_e h}{2}\right) - \frac{2}{P_e h}} \quad \square$$

On a trouvé
la méthode parfaite
pour des équations
unidimensionnelles !


$$\zeta = \coth\left(\frac{Pe^h}{2}\right) - \frac{2}{Pe^h}$$

$$\begin{aligned}\beta \frac{du}{dx} - \epsilon \frac{d^2u}{dx^2} &= 0, \\ u(0) &= u_0, \\ u(L) &= u_L,\end{aligned}$$






Zeta un peu faible ?



Zeta trop grand !



Juste bien :-)

En extrapolant
aux dimensions
supérieures...


$$w_i = \tau_i + \zeta \beta \cdot \nabla \tau_i$$



Facteur de stabilisation
Trop grand : diffusion numérique !
Trop petit : instable !

Trouver $U_j \in \mathbb{R}^n$ tel que


$$\sum_{j=1}^n \underbrace{\langle w_i \beta \cdot \nabla \tau_j + \epsilon \nabla w_i \cdot \nabla \tau_j \rangle}_{A_{ij}} U_j = \underbrace{\langle w_i f \rangle + \ll w_i g \gg_N}_{B_i}, \quad i = 1, \dots, n,$$



Non, là
c'est
instable



Là, il y a
plein,
plein,
plein
d'éléments



Bof, mais
cela devient
acceptable !

Et en payant le prix,
Galerkin fonctionne !

$$w_i = \tau_i + \zeta \beta \cdot \nabla \tau_i$$




*Pas de stabilisation !
Zeta = 0 !*

Trouver $U_j \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$\sum_{j=1}^n \underbrace{\langle w_i \beta \cdot \nabla \tau_j + \epsilon \nabla w_i \cdot \nabla \tau_j \rangle}_{A_{ij}} U_j = \underbrace{\langle w_i f \rangle + \ll w_i g \gg_N}_{B_i}, \quad i = 1, \dots, n,$$

Et maintenant
introduisons
le temps...

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$
$$u(0) = 1$$
$$u(1) = 0$$



```
epsilon = 0.01;  
L = 1
```


Différences finies (espace) Euler explicite (temps)

$$\left(\frac{U_i^{n+1} - U_i^n}{\Delta t}\right) = \epsilon \left(\frac{U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}\right)$$

En définissant $b = \frac{\epsilon \Delta t}{(\Delta x)^2}$,

$$U_i^{n+1} = U_i^n + b(U_{i+1}^n + U_{i-1}^n - 2U_i^n)$$

C'est une itération pour un vecteur qui doit converger vers la solution de régime
C'est quelque chose qu'on a déjà rencontré...

On intègre un système linéaire...


$$U_i^{n+1} = U_i^n + b(U_{i+1}^n + U_{i-1}^n - 2U_i^n)$$

En passant à une notation matricielle,

$$\begin{bmatrix} U_1^{n+1} \\ U_2^{n+1} \\ U_3^{n+1} \\ U_4^{n+1} \\ U_5^{n+1} \\ \vdots \\ U_m^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1^n \\ U_2^n \\ U_3^n \\ U_4^n \\ U_5^n \\ \vdots \\ U_m^n \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -2 & 1 & & & & & & & \\ 1 & -2 & 1 & & & & & & \\ & 1 & -2 & 1 & & & & & \\ & & 1 & -2 & 1 & & & & \\ & & & 1 & -2 & 1 & & & \\ & & & & 1 & -2 & 1 & & \\ & & & & & & & 1 & -2 \\ & & & & & & & & & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1^n \\ U_2^n \\ U_3^n \\ U_4^n \\ U_5^n \\ \vdots \\ U_m^n \end{bmatrix}$$

En définissant adéquatement u_n et A ,

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + b\mathbf{A}\mathbf{u}_n$$




On résout le système linéaire défini par :

$$\mathbf{u}'(t) = \frac{\epsilon}{(\Delta x)^2} \mathbf{A}\mathbf{u}(t)$$

$$\Delta x = 0.1, \Delta t = 0.005$$

Euler explicite



$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \underbrace{\frac{\epsilon \Delta t}{(\Delta x)^2}}_b \mathbf{A} \mathbf{u}_n$$



$$|1 + b\lambda_i| \leq 1$$

↑
Valeurs propres de
A

$$\Delta x = 0.05, \Delta t = 0.00125$$



Condition de stabilité pour la méthode d'Euler explicite....

$$\beta = \frac{\epsilon \Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Delta t \leq \frac{(\Delta x)^2}{2\epsilon}$$

Courant, Friedrichs et Lewy (1928)




```
epsilon = 0.01;  
dt = h*h/(epsilon*1.94);
```

Condition de stabilité pour la méthode d'Euler explicite....

$$\beta = \frac{\epsilon \Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Delta t \leq \frac{(\Delta x)^2}{2\epsilon}$$

Courant, Friedrichs et Lewy (1928)




```
epsilon = 0.01;  
dt = h*h/(epsilon*2.0);
```


Et maintenant
introduisons
l'advection...

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \beta \frac{\partial u}{\partial x} = \epsilon \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$u(0) = 1$$

$$u(1) = 0$$




```
epsilon = 0.01;  
beta = 0.2;  
dt = h*h/(epsilon*3.0);
```

Et comment déduire le pas de temps ?

$$U_j^n = U^n e^{ikX_j}$$

Considérons une perturbation quelconque...



$$\begin{aligned} U_j^{n+1} &= U_j^n + \Delta t \left(\overbrace{\left((\zeta - 1) \frac{\beta}{2h} + \frac{\epsilon}{h^2} \right)}^a U_{j+1}^n + \overbrace{\left(-\zeta \frac{\beta}{h} - 2 \frac{\epsilon}{h^2} \right)}^b U_j^n + \overbrace{\left((\zeta + 1) \frac{\beta}{2h} + \frac{\epsilon}{h^2} \right)}^c U_{j-1}^n \right) \\ &= U_j^n \left(1 + \Delta t \left(a e^{ikh} + b + c e^{-ikh} \right) \right) \\ &= U_j^n \left(1 + \Delta t \left(\underbrace{(a+c)}_{-b} \cos kh + b + i \underbrace{(a-c)}_{-\beta/h} \sin kh \right) \right) \end{aligned}$$

Il faut que le module
du facteur
d'amplification
soit inférieur
à l'unité :-)

$$U = \left(1 + \Delta t \left(b - b \cos kh + b - i \frac{\beta}{h} \sin kh \right) \right)$$

$$\left| \left(1 + \Delta t b - \Delta t b \cos(kh) \right) - i \Delta t \left(\frac{\beta}{h} \sin(kh) \right) \right| \leq 1$$



$$1 + \Delta t^2 b^2 (1 - \cos(kh))^2 + 2b\Delta t(1 - \cos(kh)) + \Delta t^2 \frac{\beta^2}{h^2} \sin^2(kh) \leq 1$$

$$\Delta t^2 b^2 (1 - \cos(kh))^2 + 2b\Delta t(1 - \cos(kh)) + \Delta t^2 \frac{\beta^2}{h^2} (1 - \cos(kh))^2 \leq 0$$

$$\Delta t b^2 (1 - \cos(kh)) + 2b + \Delta t \frac{\beta^2}{h^2} (1 + \cos(kh)) \leq 0$$

On déduit finalement :

$$\Delta t \leq \frac{-2b}{(1 - \cos(kh))b^2 + (1 + \cos(kh))\frac{\beta^2}{h^2}}$$

$$\Delta t \leq \frac{2(\zeta\beta h + 2\epsilon)h^2}{(\zeta h\beta + 2\epsilon)^2 + \beta^2 h^2 + \cos(kh)(\beta^2 h^2 - (\zeta h\beta + 2\epsilon)^2)}$$

On conclut donc :

$$\Delta t \leq \min\left(\frac{\zeta h\beta + 2\epsilon}{\beta^2}, \frac{h^2}{\zeta h\beta + 2\epsilon}\right)$$

Notons que l'on obtient les résultats habituels $\Delta t \leq \frac{h}{\beta}$ pour $\epsilon = 0, \zeta = 1$ et $\Delta t \leq \frac{h^2}{2\epsilon}$ pour $\beta = 0$.

Pratiquement...